

а) при биологичен контрол на яйцата с умрели ембриони през първия и втория ден от инкубацията се наблюдава жълто-кафяво петно, а при по-късно умрелите тъмно кафява черта или пръстен;

б) при биологичен контрол на яйцата с умрели ембриони през първия и втория ден от инкубацията се наблюдава бистри яйца, а при по-късно умрелите са с увеличена въздушна камера и подвижен жълтък;

в) при биологичен контрол на яйцата с умрели ембриони през първия и втория ден от инкубацията се наблюдава увеличена въздушна камера, а при по-късно умрелите се очертава мрежа от кръвоносни съдове;

макс. 4 т.

: а)

:

Отговор а) - 4 точки;

При посочени повече от един отговор - 0 точки;

Всички останали отговори - 0 точки;

4.3. Примерна тестова задача от равнище „Приложение“:

макс. 6 т.

Попълнете пропуснатите дни за извършване прегледите на видове яйца при инкубирането:

ВИД ПТИЦИ	I – преглед – ден	II – преглед - ден	III – преглед - ден
Кокоши	6	18
Пуйки	13
Патици	13	25
гъски	8

:

I – преглед: пуйки, патици на 7-ия ден – 2 точки;

II – преглед: кокоши на 11-ия ден, гъски на 15-ия ден – 2 точки;

III – преглед: пуйки на 25-ия ден, гъски на 28-ия ден – 2 точки;

При посочен един верен отговор от един вид птици – 1 точка